

Đối với những người đang uống thuốc chống đông máu

Tùy vào loại thuốc đang uống, có thể xảy ra khó khăn trong việc cầm máu khi bị chảy máu, vì vậy thông qua phiếu kiểm tra y tế sơ bộ chúng tôi xin được hỏi về chủng loại thuốc mà bạn đang sử dụng.

Bạn có thể nhận tiêm chủng, nhưng cần lưu ý tình trạng chảy máu sau khi tiêm.

Những điểm cần lưu ý khi tiêm chủng (Tiêm vào cơ bắp)

Sau khi tiêm xong hãy ấn chặt vào chỗ tiêm trên 2 phút.



- Xin hãy trao đổi với bác sĩ nếu xuất hiện các triệu chứng như sưng và tê cánh tay v.v...
- Bạn không cần thiết phải ngưng uống thuốc khi tiêm chủng.

Áp dụng
cho loại

Thuốc chống đông máu

Là loại thuốc phần nhiều được kê toa cho người bị chứng rối loạn nhịp tim, huyết khối tĩnh mạch, hoặc các bệnh nhân sau phẫu thuật tim.

Tên thương mại	Tên gọi chung (tên hoạt chất)
Thuốc Warfarin	Thuốc Warfarin Potassium
Thuốc Prazaxa	Thuốc Dabigatran Etexilate
Thuốc Xarelto	Thuốc Rivaroxaban
Thuốc Eliquis	Thuốc Apixaban
Thuốc Lixiana	Thuốc Edoxaban Tosilate Hydrate

Thuốc chống đông máu cũng gồm những loại thuốc như sau,

Tuy vậy bạn vẫn có thể tham gia tiêm chủng như bình thường.

Thuốc chống kết tập tiểu cầu, v.v...

Là loại thuốc phần nhiều được kê toa cho người bị bệnh xơ cứng động mạch, hẹp van tim và nhồi máu cơ tim, người đã trải qua cơn tai biến nhồi máu não, hoặc mắc hội chứng tắc động mạch chi dưới.

Tên thương mại	Tên gọi chung (tên hoạt chất)	Tên thương mại	Tên gọi chung (tên hoạt chất)
Thuốc Bayaspirin	Thuốc Aspirin	Thuốc ComPlavin saCA	Thuốc Clopidogrel Sulfate, Aspirin
Thuốc Panaldine	Thuốc Ticlopidine Hydrochloride	Thuốc viên TAKELDA	Thuốc Aspirin Lansoprazole
Thuốc Plavix	Thuốc Clopidogrel Sulfate	Thuốc Epadel	Thuốc Ethyl Icosapentate (EPA)
Thuốc Effient	Thuốc Prasugrel Hydrochloride	Thuốc Dorner, Procylin	Thuốc Beraprost Sodium
Thuốc Pletal	Thuốc Cilostazol	Thuốc Anplag	Thuốc Sarpogrelate Hydrochloride
Thuốc Bufferin	Thuốc dạng hợp chất Aspirin và Dealuminate		
Thuốc Brilinta	Thuốc Ticagrelor		

v.v...