

Para sa mga kumukuha ng gamot upang maiwasan ang pamumuo ng dugo.

Maaaring mahirapan tumigil ang dugo depende sa gamot na iniinom , kaya itinatanong kung anong uri ng gamot ang iniinom sa pre-examination slip.

Maaaring makapagbakuna, ngunit mag-ingat sa pagdurugo pagkatapos nito.

Pag-iingat para sa pagbabakuna (intramuscular injection)

Pagkatapos ng pagbabakuna, hawakan nang mahigpit ng hindi bababa sa 2 minuto.



- Kung nakakaranas ng mga sintomas tulad ng pamamaga o pamamanhid sa mga bisig, mangyaring kumunsulta sa doktor.
- Hindi kailangang ihinto ang mga iniinom na gamot kahit nakapagbakuna.

Target na mga gamot

Anticoagulant

Ang gamot na ito ay madalas na inireseta pagkatapos ng arrhythmia, thrombosis, at operasyon sa puso.

Pangalan ng produkto	Pangkalahatang Pangalan
Warfarin	Warfarin Potassium
Prazaxa	Dabigatran Etextilate
Xarelto	Rivaroxaban
Eliquis	Apixaban
Lixiana	Edoxaban Tosilate Hydrate

Ang mga sumusunod na gamot ay magagamit din upang mapabuti ang daloy ng dugo. Gayunpaman, maaari pa rin makapagbakuna.

Antiplatelet na gamot atbp.

Ang gamot na ito ay madalas na inireseta para sa mga taong may arteriosclerosis, angina / myocardial infarction, cerebral infarction, at lower limb arterial occlusion.

Pangalan ng produkto	Pangkalahatang Pangalan	Pangalan ng produkto	Pangkalahatang Pangalan
Bayaspirin	Aspirin	ComPlavin saCA	Clopidogrel Sulfate, Aspirin
Panaldine	Ticlopidine Hydrochloride	TAKELDA Combination Tablets	Aspirin Lansoprazole
Plavix	Clopidogrel Sulfate	Epadel	Ethyl Icosapentate (EPA)
Effient	Prasugrel Hydrochloride	Dorner, Procylin	Beraprost Sodium
Pletal	Cilostazol	Anplag	Sarpogrelate Hydrochloride
Bufferin	Aspirin and Dealuminate composition		
Brilinta	Ticagrelor		

Atbp.